

Pflichttext Postericort®

DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH, Berlin

Postericort® Salbe

Postericort® Zäpfchen

Wirkstoff: Hydrocortisonacetat. Verschreibungspflichtig.

Zus.:

1 g Salbe enthält 3,3 mg Hydrocortisonacetat (Ph. Eur.). Sonst. Bestandt.: Phenoxyethanol, gelbes Vaseline, gereinigtes Wasser, Wollwachs (enth. Butylhydroxytoluol).

1 Zäpfchen enthält 3,3 mg Hydrocortisonacetat (Ph. Eur.). Sonst. Bestandt.: Hartfett, mittelkettige Triglyceride.

Anw.:

Postericort® Salbe: Zur Behandlung von akutem, juckendem, gerötetem Analekzem.

Postericort® Zäpfchen: Zur Linderung von akuten, juckenden, geröteten Analekzemen, insbesondere im Analkanal und angrenzenden Enddarm.

Gegenanz.:

Überempfindlichkeit gg. einen Bestandteil des Arzneimittels, spezifische Hautprozesse (z. B. Tuberkulose, Lues, Gonorrhoe) im Behandlungsbereich, Varizellen, Vakzinationsreaktionen, bakterielle Hautinfektionen, Mykosen, periorale Dermatitis, Rosacea, Säuglinge.

Nebenw.:

Allergische Hautreaktionen (allergische Follikulitiden, Lokalreaktion, Blutung, Brennen, Juckreiz, Trockenheit, Spannung im Analbereich); bei länger dauernder Anwendung Hautatrophien, Steroidakne, Teleangiektasien, Striae.

Warnhinw.:

Postericort® Salbe enthält Wollwachs und Butylhydroxytoluol. Packungsbeilage beachten.

Weit. Hinw. s. Fach- und Gebrauchsinfo.

Stand: 06/2018